**XXVII CONGRESO ARGENTINO
DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
F.A.S.G.O. 2011**

*7 de diciembre
Mar del Plata*

FASGO

**“CONCEPTO ACTUAL DEL BAJO GRADO
COMO LESIÓN INTRAEPITELIAL”**

S.O.G.B.A.R

Dra. Patricia Cingolani

MANEJO DEL CIN I
CONTROLAR O NO TRATAR

CIN I TRATAR O NO TRATAR

CIN I - OBSERVACION O TRATAMIENTO

LSIL: CUANDO TRATAR

CIN I - ¿OBSERVACION O TRATAMIENTO?

CIN I TRATAR O NO TRATAR

CONTROVERSIA: ¿TRATAR O NO TRATAR LSIL?

MANEJO DEL CIN I
NO TRATAR LSIL

CIN I - ¿OBSERVACION O TRATAMIENTO?

El concepto y terminología de las alteraciones premalignas cervicales han evolucionado acorde al avance del conocimiento de su biología e historia natural

Etiología Ca. de cuello → infección por HPV

El término CIN se sustituyó:

SIL	Bajo grado (LSIL)	Autolimitada. Raramente progresa a carcinoma.
	Alto grado (HSIL)	Verdaderos cambios premalignos

↑↑↑ Número de ♀ con LSIL → Problema no resuelto

Grupo **heterogéneo** respecto al riesgo de desarrollo de Ca. de cuello

1 Subgrupo sufre **tratamiento Innecesario**

1 Subgrupo sometido a **conducta expectante** pero la lesión progresará

Imprescindible el conocimiento de la historia natural de la enfermedad y actuar **SOLAMENTE** si es necesario

- 80-90% se resuelven espontáneamente
- 10-20% persisten

Esclarecimiento de posibles **marcadores de progresión**

Infecciones por HPV

La mayoría **transitorias**

Gran número de ♀
jóvenes con LSIL

Tratamientos **innecesarios**

- Citología
- Colposcopia
- Biopsias eventuales
- Determinación HPV de alto riesgo

Seguimiento **seguro** focalizado **en la historia natural**

La denominación displasia leve, CIN I y las alteraciones celulares provocadas por HPV, corresponden al LSIL desde la **Convención de Bethesda**

CIN I y CONDILOMA
SIN DISPLASIA

→ UNA MISMA CATEGORIA → LSIL

AMBOS IGUAL POTENCIAL BIOLÓGICO DE PROGRESIÓN A HSIL

± 15 % PARA AMBOS

CLASIFICACIÓN CITOLÓGICA DE BETHESDA, 2001

1. Negativo para lesión intraepitelial o malignidad:

2. Células epiteliales anormales:

CÉLULAS ESCAMOSAS:

CÉLULAS ESCAMOSAS ATÍPICAS (ASC) (atypical squamous cells).

- De significado indeterminado (**ASC-US**) (atypical squamous cells of undertermined significance)
- Que no pueden excluir lesión escamosa intraepitelial de alto grado (**ASC.H**) (atypical squamous cells cannot exclude HSIL)

LESIÓN ESCAMOSA INTRAEPITELIAL DE BAJO GRADO (LSIL) (LOW GRADE SQUAMOUS INTRAEPITHELIAL LESIÓN),

Incluye **infección por VHP/ displasia leve / CIN 1** (cervical intraepithelial neoplasia de grado 1)

LESIÓN ESCAMOSA INTRAEPITELIAL DE ALTO GRADO (HSIL) (high grade squamous intraepithelial lesion)

Incluye **displasia moderada y severa / CIN 2** (cervical intrepithelial neoplasia de grado 2) **y CIN 3** (cervical intraepithelial neoplasia de grado 3) / **carcinoma escamoso in situ.**

Concepto de CIN → Gran cambio en la última década

Históricamente:

TRATAMIENTO

NO CONSTITUYE UNA PATOLOGIA QUE EVOLUCIONARA
A DISTINTOS ESTADIOS CIN I → CIN II → CIN III

ABARCA 2 ENTIDADES DIFERENTES

**A- UNA INFECCION VIRAL
GENERALMENTE
AUTOLIMITADA**

**B- UNA PATOLOGIA
NEOPLASICA EPITELIAL**

- ❖ **No toda lesión premaligna progresa a una lesión invasora**
- ❖ **No todo cáncer tempranamente invasor causa la muerte**
- ❖ **Se conoce más acerca de la neoplasia cervical que de ningún otro cáncer**

**INFECCIÓN POR HPV:
PRE-REQUISITO
PARA EL CA. CUELLO**

COFACTORES

INMUNIDAD

HPR ALTO RIESGO

**CAUSALIDAD MEJOR ESTABLECIDA QUE NINGUN
OTRO TIPO DE CANCER**

Factor de riesgo	Cáncer	Riesgo relativo
Cigarrillo	Pulmón	10
Virus Hepatitis	Hígado	50
HPV	Cuello	300 - 400

HPV → Ca. de cuello

♀ Con HPV → CANCER
♀ Sin HPV → NO CANCER

HPV + **no** implica patología

HPV + **no** es un marcador **pronóstico**

AR → Patología
Br → No “

♀ HPV + → **grupo de riesgo** para desarrollar patología

Técnicas moleculares → ♀ que la desarrollarán

La infección por HPV es un proceso dinámico

Relación del HPV con el huésped

Inicio **vida sexual** → 2 años → 50% **infección HPV**

Durante la **vida** → > 80 % **contacto** con el virus

A los 3 años
de la Infección
c/ ó s/ lesión

Sist. Inmunológico

90 % **Clearence**

10 % **Persisten**

HSIL

TIPO VIRAL

COFACTORES

- EDAD
- Nº PAREJAS
- TABACO
- USO PROLONGADO ACO
- OTRAS ITS (CLAMYDIA)
- INMUNOSUPRESION
- PARIDAD
- NUTRICION

STATUS INMUNOLOGICO

**RELACIÓN ENTRE TABAQUISMO Y PROBABILIDAD DE
REGRESIÓN ESPONTÁNEA DE LAS LESIONES
PRECURSORAS CERVICALES**

516 mujeres con LSIL seguidas c/ 4 meses x 2 años.

El tabaco interfiere en la regresión espontánea del LSIL

C/ inmunidad normal suprimen LSIL inducidas x HPV

CIN I

- Grupo heterogéneo de lesiones con bajo potencial de malignidad.
- Igual riesgo que la **sola infección** por HPV
- Ambas pueden **regresar** por la **activación del sistema inmune del huésped**.

CIN I → conducta expectante.

- Secuelas del tratamiento.
- Alta chance de **regresión** 2 a 4 años sin tratamiento (Luego la tasa de regresión declina)

HPV → CELULA → SUSCEPTIBLE CAMBIOS NEOPLASICOS

INFECCION DINAMICA INTERACCION CON EL SISTEMA INMUNOLOGICO DEL HUESPED

CONTACTO CON HPV

SUPERFICIAL	EPITELIAL	EPITELIAL
TRANSITORIO	INMUNIDAD NO ESPECIFICA INNATA	TH2 I. ESPECIFICA ADQUIRIDA HUMORAL/ANTICUERPOS
	TRANSITORIO	TRANSITORIO

HPV → CELULA → SUSCEPTIBLE CAMBIOS NEOPLASICOS

INFECCION DINAMICA INTERACCION CON EL SISTEMA INMUNOLOGICO DEL HUESPED

CONTACTO CON HPV

INFECCION

INMUNIDAD CELULAR – TH 1
Células citotóxicas-memoria

FALLO EN LA INMUNIDAD
CELULAR

INFECCION TRANSITORIA
SIN ALTERACION CELULAR

ALTERACION CELULAR

INFECCION POR HPV / HISTORIA NATURAL

EXPOSICION AL VIRUS

Prevención 1ª: Previene aparición enfermedad

ENFERMEDAD

DETECCION PRECOZ

Prevención 2ª:
·Detección en estadio inicial
·Previene la progresión
·Disminuye la mortalidad
·**No modifica la incidencia**

SIGNO-SINTOMATOLOGIA

Prevención 3ª

CURACION TOTAL / MUERTE

TAMIZAJE O CRIBAJE

PRUEBA

**DETECCION DE POBLACION
CON RIESGO POTENCIAL
DE LA ENFERMEDAD**

**SELECCIÓN X MEDIO DE UNA
PRUEBA DE LA POBLACION
REALMENTE ENFERMA**

TRIAGE

**TRATAMIENTO/SEGUIMIENTO
ADECUADO**

LA **INMUNIDAD CELULAR** ES EL FACTOR PRINCIPAL PARA EL CONTROL DE LA INFECCION.

PERO...

EL VIRUS PUEDE EVADIR AL SIST. INMUNOLOGICO

LA **PREVENCION 1ª** ES EL MEJOR METODO DE PREVENCION

TRATAMIENTO

LESION

**GRADO HISTOLOGICO
TAMAÑO
LOCALIZACION
COMPROMISO ENDOCERVIX**

PACIENTE

**EDAD
DESEO DE EMBARAZO
POSIBILIDAD DE SEGUIMIENTO**

GINECOLOGO

**EXPERIENCIA
DISPONIBILIDAD DE MEDIOS
LUGAR DE TRABAJO**

OBSERVAR	TRATAR
✓ MENOR 25	MAYOR
✓ COLPO SATISFACTORIA	INSATISFACTORIA
✓ CONCORDANCIA CCH	DISCORDANCIA
✓ LESION PEQUEÑA	EXTENSA
➤ LESION CENTRAL	PERIFERICA
✓ SEGUIMIENTO POSIBLE	NO POSIBLE
✓ PERSISTENCIA MENOR 2 AÑOS	MAYOR
✓ NO COMPROMISO ENDOCERVIX	COMPROMISO

*** Control cito colposcópico semestral / anual**

Puig Tintoree et al prog obsteg ginecol. 2006

TENER EN CUENTA PARA “OBSERVAR”

- TABAQUISMO**
- ANTICONCEPTIVOS HORMONALES**
- INMUNOSUPRESION**
- FACTORES NUTRICIONALES**
- ALTERACIONES HORMONALES**

El manejo del LSIL se focaliza hoy

en la **Observación**

MANEJO CONSERVADOR

CIN I n 415

Seguimiento con colposcopia
+
Tratamiento sólo en caso de progresión

Vs.

Tratamiento inmediato con LEEP

18 Meses seguimiento

Riesgo de progresión a CIN 2-3 ó cáncer
SIMILAR EN AMBOS GRUPOS

SEGUIMIENTO → RAZONABLE ESTRATEGIA DE MANEJO

CRIOCIRUGIA Vs. REGRESION ESPONTANEA DE LSIL

Comparando la **regresión espontánea** de LSIL confirmado por biopsia en ♀ de 30 años ó >, respecto de las tratadas con **criocirugía**:

Los resultados fueron similares (aprox. 80 %)

La criocirugía no acelera el clearance de la infección por HPV en ♀ con LSIL

ASC-US

Manejo agresivo
aun sin sospecha de CIN

Rápida normalización
citológica

Manejo no agresivo
aún con sospecha de CIN

< **Número de LEEP**, en su
mayoría innecesarios

A 10 años de seguimiento **ambos grupos:**

- **Igual** normalización citológica
- **Igual** % de CIN

Seguimiento cito-colposcópico

Igualmente seguro
Iguales resultados

Manejo agresivo

Bp. Dirigidas

Tratamiento eventual de HSIL

Seguimiento cito-colposcópico de lesiones LSIL ó <

**Adecuado balance entre beneficios y riesgos
en el manejo del LSIL**

**LEEP inmediato
no se recomienda**

Sobret ratamiento

Efectos adversos posteriores

UTILIDAD DEL TEST DE DNA / HPV EN CON CITOLOGÍA LSIL

Seguimiento de con LSIL, con test de HPV
Estudio más largo a la fecha.

No hubo diagnóstico histopatológico de CIN II-III en
con **HPV Test neg**

El test de HPV puede seleccionar aquellas con
citología LSIL, entre aquellas de **alto o bajo riesgo de
desarrollar CIN II ó III durante su seguimiento.**

EVALUACIÓN Y MANEJO EN ADOLESCENTES

Adolescentes: la > tasa de Infecciones por HPV

- Comportamiento sexual de riesgo

- Vulnerabilidad biológica

Infección y lesión histológica

Transitorias

Clearence frecuente

ESTRATEGIA

Citología + ASCUS ó LSIL / Histología LSIL

Seguimiento cito-colposcópico anual por 2 años

Manejo de citología anormal en adolescentes

- ✓ La infección por HPV es altamente prevalente
- ✓ El cáncer es casi inexistente en esta población

Guía de consenso 2006 de la Asoc. Amer. PC y C

- ❖ **No recomienda el test de HPV DNA**
 - ❖ **No recomienda el tratamiento de las lesiones LSIL**
 - ❖ **El tto. de las lesiones CIN II podría diferirse**
- **Minimizar impacto negativo en la fertilidad**
 - **Considera la historia natural de la Infección en esta población**

ENTONCES: TRATAR.... NO TRATAR.....

La propuesta es **CONTROLAR** a las ♀ jóvenes

Gran % **regresión** ← **ADOLESCENTES** → Bajo % **progresión**

Terreno favorable para la infección	Etapa con características particulares
<ul style="list-style-type: none">✓ Inicio precoz RS✓ Múltiples parejas sexuales✓ Metaplasia inmadura cérvix con gran actividad mitótica✓ Fuman✓ ACO desde temprana edad	<ul style="list-style-type: none">• Invulnerabilidad• Falta de compromiso con tratamiento y seguimiento• Ocultamiento a los padres• Migración por estudios

Requisito indispensable para no tratar ← **Seguimiento**

147 adolescentes sexualmente activas con diagnóstico LSIL → Seguimiento 24 meses

**Regresión - ASCUS 91%,
- LSIL 63.6%,
- HSIL 50%**

Progresión de LSIL 6 %

Recomendación:

**En adolescentes → MANEJO CONSERVADOR
dada la alta tasa de regresión,
pero**

**Mantener un CUIDADOSO SEGUIMIENTO dado
que la posibilidad de progresión es baja pero NO NULA**

477 ADOLESCENTES CON CIN → SEGUIMIENTO: 11.5% HSIL 88% LSIL

A 12 MESES 27% LSIL REGRESO 14% PROGRESO 57% PERSISTIO

A 24 MESES 54% LSIL REGRESO 26% PROGRESO 19% PERSISTIO

A 35 MESES 61% LSIL REGRESO 31% PROGRESO 6.9% PERSISTIO

CONIZACION 6 %

ADENOCIS 1 CASO

PONER EN LA BALANZA CUAL ES EL RIESGO MAYOR:

-REALIZAR UN **TRATAMIENTO** POCO AGRESIVO Y QUIZAS INNECESARIO EN UNA POBLACION CON ALTO % DE REGRESION PERO **NO NULO**.

-O CONFIAR EN EL **SEGUIMIENTO ESTRICTO** DE UNA PACIENTE QUE PROBABLEMENTE..... NO VOLVAMOS A VER

Cada ♀ requiere
un vestido
a medida

CALENDARIO NACIONAL DE VACUNACIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 2011

2º semestre del 2011

Edad	BCG (1)	Hepatitis B (HB) (2)	Neumococo Conjugado	Pentavalente (DPT-Hib-HB) (3)	Cuádruple (DPT-Hib) (4)	Sabin (OPV) (5)	Triple Viral (SRP) (6)	Gripe	Hepatitis A (HA) (7)	Triple bacteriana Celular (DPT) (8)	Triple bacteriana Acelular (dTap) (9)	Doble bacteriano (dT) (10)	VPH (11)	Doble viral (SR) (12)	Fiebre Amarilla (FA) (13)	Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) (14)
Antes de nacer	Única dosis [A]	3 dosis														
2 meses		1ª dosis	1ª dosis	1ª dosis		1ª dosis										
4 meses			2ª dosis	2ª dosis		2ª dosis										
12 meses				3ª dosis		3ª dosis			Única dosis						Única dosis	
18 meses						4ª dosis		1ª dosis								
5-6 años (Ingreso escolar)						Refuerzo		2ª dosis								
11 años								Iniciar o completar					3 dosis (sólo niñas)			
A partir de los 15 años																Única dosis
16 años																
Cada 10 años																Refuerzo
Embarazadas								Desis Anual								
Puerperio								Desis Anual								Única dosis
Personal de Salud		3ª dosis														

EDUCAR

PREVENIR

LEGISLAR

(Consultar al médico acerca de las vacunas que deben recibir los niños que comenararon su vacunación según el calendario anterior)

[A] Antes de egresar de la maternidad.

[B] En las primeras 12 horas de vida.

[C] Si no hubiera recibido el esquema completo aplicar 1ª dosis, 2ª dosis a los 4 meses y 3ª dosis a los 18 meses de la primera.

[D] Previene la meningitis, neumonía y otitis por neumococo.

[E] Si no hubiera recibido 3 dosis de triple viral o una de Triple viral aplicar las 3 dosis de triple viral.

[F] Debe aplicarse en la primovacunación y en la vacunación de refuerzo, separadas por cuatro meses.

[G] Los niños que no recibieron la vacuna durante el embarazo y los primeros meses deberán recibir vacuna a los 11 años.

[H] Se indica a personal de salud que atienden a niños menores de 1 año.

[I] Los que comenzaron el plan dTap les corresponde este refuerzo a los 21 años.

[J] La vacuna contra el VPH está indicada solamente para niñas de 11 años. Aplicar 1ª dosis, 2ª dosis al mes de la primera y 3ª dosis a los 6 meses de la primera.

(1) BCG Tuberculosis (formas invasivas)

(2) HB Hepatitis B

(3) Pentavalente: (Pentavalente) difteria, tétanos, Tos convulsa, Hep B, Haemophilus influenzae b

(4) DPT-Hib: (Difteria, tétanos, Tos convulsa, Haemophilus influenzae b)

(5) OPV: (Sabin) vacuna contra la poliomielitis oral.

(6) SRP: (Triple viral) vacuna contra el sarampión, rubéola y paperas.

(7) HA: (Hepatitis A) vacuna contra la hepatitis A.

(8) DPT: (Triple bacteriana) vacuna contra la difteria, tétanos y tos convulsa.

(9) dTap: (Triple bacteriana acelular) vacuna contra la difteria, tétanos y tos convulsa.

(10) Doble bacteriana: vacuna contra el tétanos y la difteria.

(11) VPH: vacuna contra el virus del papiloma humano.

(12) SR: (Doble viral) sarampión, rubéola.

(13) FA: (Fiebre amarilla) una dosis para residentes o viajeros a zonas de riesgo.

(14) FHA: (Fiebre hemorrágica argentina) una dosis para residentes o viajeros a zonas de riesgo.

VACUNARSE ES SER SOLIDARIO:
te protege contra muchas enfermedades
a vos y a quienes te rodean.

Más información
www.msal.gov.ar
vacunass@msal.gov.ar
0800-222-1002

"Cuando una mujer se muere de cáncer de cuello uterino, todos los gobiernos del mundo deberían avergonzarse"

W. Rivoire

Dra. Patricia Cingolani
doctoracingolani@hotmail.com.ar